Инструкция по применению

Винтерфит (Зимний консервант)

Артикул: 0702

Зимний консервант против появления водорослей и известняковых образований в бассейне

Приготовлен с использованием бензалкония хлорида (<20%)

Свойства

- слегка пенящийся
- pH нейтральный
- препятствует образованию налётов извести
- предотвращает рост водорослей в зимний период
- существенно облегчает весеннюю подготовку бассейна
- предотвращает появление грибков и бактерий в углах, швах и краях бассейна

Применение

Понизить уровень воды на 20 см ниже верхнего слива или скиммера. Расчётное количество консерванта разбавить водой 1:10 и медленно вылить в бассейн вдоль бортиков.

Внимание: Перед применением препарата необходимо убедиться в отсутствии свободного хлора в воде. При наличии хлора в воде рекомендуется понизить уровень хлора при помощи препарата Хлор-стоп контролируя уровень pH. Применять препарат можно не менее чем через 10 часов после использования Хлор-стоп.

Винтерфит не предохраняет воду от замерзания!

Жёсткость воды	Дозировка на 10 м^3 воды
Менее 300ppm	300 мл
Более 300ppm	600 мл

Рекомендации: в тёплую зиму распад продукта происходит быстрее, поэтому добавка Винтерфита или Альба весьма рациональна.

Весной очевидно, что слабые налёты извести легко удаляются прибором для чистки под высоким давлением, а запущенные образования исчезнут после применения таких препаратов, как Компактал или Банисол G. Коричневые пятна от листвы легко удалить 1%-ым раствором гранулированного хлора 65.

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!

Хранение и транспортировка:

Хранение реагентов должно производиться в крытых или закрытых сухих, вентилируемых помещениях при температуре от +3 до +25 градусов Цельсия. Запрещено хранение и складирование препаратов под открытыми солнечными лучами. Влажность воздуха при хранении не должна превышать 60%

Срок хранения 5 лет.

Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: быстрое перемещение химических реагентов после холодной перевозки в теплое помещение, необходимо постепенное выравнивание температуры, не быстрее, чем 3-4 часа